

Návod na pěstování cibulovin

Hyacinty

Jsou mrazuvzdorné, vhodné pro pěstování na záhonech i pro rychlení v nádobách (nutná příprava cibulí).

Vyžadují propustnou zeminu s dostatkem živin a slunné stanoviště (vyhovuje i polostín).

Na jaře půdu na záhonech prokypříme a přihnojíme např. Cereritem. Odkvetlé květy včas odstraňujeme, aby se netvořily semeníky, které rostlinu oslabují.

Doporučuji každoroční sklizení hyacintů (nesnášejí letní vysoké teploty půdy, mohou zahnit) ihned jakmile začínají listy žloutnout. Ukládáme do lísek na stinném místě, průběžně prohlížíme stav cibulí.

Výsadbu doporučuji provést po 15. říjnu, kdy je již půda chladnější. Cibule vysazujeme tak aby nad nimi byla 7-10 cm vrstva zeminy.

Modřence

Jsou zcela mrazuvzdorné a odolné i výkyvům počasí. Na stanovišti mohou zůstat i několik let. Na pěstování jsou nenáročné, nemají žádné zvláštní požadavky na půdu ani stanoviště, po čase trsy vytvářejí koberec květů. Výška květů je kolem 15 cm a dají se řezat i do váziček. Výsadbu cibulek modřenců provádíme kdykoliv na podzim, po cca 15. září až do konce listopadu, do hloubky cca 5 cm. Při včasné výsadbě vytvoří rostliny do zimy nové listy, což je pro tyto cibuloviny typické.

Česneky

Výsadbu je třeba provádět po 15. říjnu, až je půda chladnější. Hloubka výsadby je cca 7-10 cm. Česneky jsou poměrně odolné, vyžadují však lehčí propustnější zeminu. Každoročně je vhodné cibule sklízet, jakmile začínají listy žloutnout.

Korunky

Jsou okrasou jarní zahrádky. Při výsadbě je třeba dodržet zásadu – cibule zasadit co nejhlouběji na kompostem vyhnojené stanoviště (na stav živin v půdě jsou velice náročné). Pokud mají cibule při sázení kořínky není to na závadu, jen je třeba postupovat s maximální opatrností, aby nedošlo k jejich poškození. Vytvářející se kořínky jsou signálem, že je možno začít s jejich výsadbou, tu provádíme již od začátku září. Záhonky by měly být na slunných místech, v polostínu nebo ve stínu hůře zakvétají. Brzy na jaře provádíme přihnojení např. Cereritem. Pokud je sucho je třeba vydatně zalévat. Na stanovišti mohou korunky zůstat i několik let.